

(( هفته پیشگیری از مسمومیت ها -  
اتا ۷ آبان ماه ))

با افزایش آگاهی مانع  
مسمومیت دارویی شویم .

## پیام های آموزشی فرهنگی و هشدار دهنده



قارچ های سمی از روی ظاهر شناخته نمی شوند

بعضی از مسمومیت های غذایی کشنده است / غذاهای کنسرو شده را حتما ۲۰ دقیقه بجوشانید

بروز مسمومیت غذایی نتیجه مصرف غذاهای آلوده است

کودکان پرخطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیتها می باشند

هیچ گاه در داخل اتومبیل با موتور روشن در مدت هر چند کوتاه، نجاوید

ایمن ، خانه تکانی کنید، کمردرد، سقوط، آگزما و مسمومیت در کمین شماست

مسمومیت با سموم دفع آفات از خطرناکترین و کشنده ترین موارد مسمومیت ها است

مسمومیت با گاز منوکسید کربن کشنده ترین مسمومیت غیر عمدی

پیشگیری از مسمومیت در کودکان را جدی بگیرید/بیشترین مسمومیت ها مربوط به کودکان زیر ۵ سال

مواد شوینده و شیمیایی را در کمد های قفل دار قرار دهید

89 درصد مسمومیت ها در منزل اتفاق می افتد

مسمومیت با قرص برنج کشنده است

گیاهان خانگی دلیل عمده مسمومیت در کودکان است

مسمومیت با مواد شیمیایی از مشکلات جدی در میان کودکان است





مسمومیت‌های خانگی در اثر گاز کلر منجر به بیماری آسم شود

خيارهای گلخانه ای را با احتیاط مصرف کنید

مواد غذایی خام را در طبقات پایینی یخچال نگهداری کنید

رعایت اصول ایمنی اصلی ترین راه جلوگیری از مسمومیت با گاز با منوکسید کربن

مصرف دارو بیش از مقدار تعیین شده، شایع ترین علت مسمومیت در جهان است

فرد غیرهوشیار مسموم شده با مواد اسیدی و قلیایی نباید استفرغ کند

مسموم دفع آفات را در ظروف مشابه مواد خوراکی و آشامیدنی نگهداری نکنید

داروهای خود را در مقابل چشم کودکان مصرف نکنید


مسمومیت با متادون شایعترین مسمومیت خطرناک و کشنده در کودکان است

ساک خرید و کیسه های نایلونی را دور از دسترس کودکان قرار دهید

نصب بخاری در حمام ممنوع!

مسمومیت های دارویی در کودکان اغلب از روی کنجکاوی است

صرف مقادیر زیاد گیاه دارویی سنبل الطیب ایجاد مسمومیت می کند



تهیه و تنظیم : امور دارویی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان

مهر ماه ۱۳۹۵