

## کم کاری مادرزادی تیروئید:

کم کاری تیروئید نتیجه کاهش در سنتز هورمون تیروئید یا کاهش فعالیت گیرنده های هورمون تیروئید است. شایعترین علت کم کاری مادرزادی تیروئید اختلال در تکامل کامل یا نسبی غده تیروئید یا اختلال در جایگزینی نامناسب تیروئید در دوران جنینی است که به دو نوع دائمی و گذرا تقسیم می شود.

## علائم و نشانه های بیماری :

این بیماری کم علامت بوده و فقط حدود ۵ درصد موارد ابتلا در روز های اولیه پس از تولد دارای علائم و نشانگان بیماری هستند و معمولاً تشخیص بیماری در روزهای اولیه زندگی به ندرت داده می شود. عدم تشخیص به موقع و درمان دیررس سبب از دست دادن ضریب هوشی به درجات مختلف و در نهایت باعث عقب ماندگی ذهنی در مبتلایان خواهد گردید.

شناسایی بیمار: با انجام برنامه غربالگری نوزادان متولد شده ، بیماری به راحتی قابل شناسایی و درمان بوده و درمان بیماری به راحتی امکان پذیر می باشد.

در برنامه غربالگری، نوزادان متولد شده بایستی در روز های ۳-۵ بعد از تولد جهت انجام نمونه گیری به مرکز نمونه گیری مراجعه نمایند. نمونه گیری از پاشنه پای نوزاد به روشی بسیار ساده از پاشنه پای نوزاد انجام می شود پس از انجام آزمایش والدین می توانند با تماس تلفنی با مرکز نمونه گیری از وضعیت سلامت نوزاد خود آگاه شوند.

برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان از سال ۱۳۸۵ جهت شناسایی نوزادان بیمار شروع گردیده و هم اکنون پوشش برنامه غربالگری نوزادان در استان بیش از ۹۰ درصد میباشد که انشاء... با همکاری والدین عزیز این پوشش به صددرصد نزدیک شود.

مراکز نمونه گیری در همه شهرستان ها ، بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی روستایی و حتی بعضی از خانه های بهداشت فعال و آماده نمونه گیری از نوزادان عزیز می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ستاد بیماری های شهرستان های استان تماس حاصل فرمائید.